

## Hepatit B - postpartumprofylax till nyfödda

### Nyfödda barn till HBsAg-pos mödrar

Barn till mödrar med hepatit B-smitta bör få första dosen av monovalent hepatit B-vaccin snarast efter födseln. Barn till mödrar med hög smittsamhet (HBeAg-positiva) ges både vaccin och immunglobulin mot hepatit B, snarast efter födseln.

### Handläggning

Barnet vaccineras efter ordination av barnläkare snarast efter födelsen av barnmorska på förlossningen. Dokumenteras på FV2.

Barnläkaren skriver på FV2 att BVC ska vaccineras med monovalent HB-vaccin vid 1 mån ålder och därefter enligt ordinarie schema.

Att amma sitt barn möter inget hinder ur smittosynpunkt.

### UPPFÖLJNING BVC

Fortsatt vaccination mot Hepatit B enligt schema:

- en dos vid 4 veckor med Engerix-B 10 µg/0,5 ml i m (obs! får ej senareläggas!)
- en dos 6-valent DTP-Polio-Hib-HB vid 3, 5 och 12 mån (ordinarie schema).

(rutin med provtagning vid 12 mån är borttagen; L Ekholm, M Björkqvist, mars 2015)

Länkar:

[Vårdrutiner för nyfödda på förlossning/BB/eftervård – gemensamt för vårdkedjan i RÖL](#)

[Kunskapsunderlag Hepatit B vaccination till riskgrupper Rekommendationer om vaccination mot Hepatit B](#)

Granskat av: Gunlög Rasmussen Smittskyddsläkare, Maria Björkqvist överläkare Barn- och ungdomskliniken  
Leif Ekholm Barnhälsovårdsöverläkare, Lovisa Bergengren överläkare Kvinnokliniken