

## P Parasitsjukdomar

### Medel mot springmask

Pyrvin

**Vanquin**

tabl 50 mg  
(receptfritt)

### Medel mot spol- och springmask

Mebendazol

**Vermox**

oral suspension 20 mg/ml  
tabl 100 mg

### Medel mot flatlöss

Disulfiram + bensylbensoat

**Tenutex**

kutan emulsion 20 mg/g + 225 mg/g

### Medel mot huvudlöss

Dimetikon

Medicintekniska produkter (CE-märkta)  
luskam

### Medel mot skabb

Disulfiram + bensylbensoat

**Tenutex**

kutan emulsion 20 mg/g + 225 mg/g

För behandling av springmask är mebendazol (**Vermox**) och pyrvin (**Vanquin**) likvärdiga. **Vermox** doseras 100 mg som engångsdos och är säkert att ge från ett års ålder trots varning i FASS. **Vanquin** doseras 50 mg per 10 kg kroppsvikt som engångsdos. För båda preparaten upprepas behandlingen efter 2–3 veckor för att undvika reinfektion.

Tillgången på effektiva lusmedel är mycket begränsad. Förstahandsmedel vid behandling av huvudlöss är medicintekniska produkter (CE-märkta) innehållande **dimetikon** som är en silikonolja som appliceras i hårbotten (t ex Hedrin eller Nyda). Vid behandlingsmisslyckande rekommenderas disulfiram + bensylbensoat (**Tenutex**). Det är viktigt att noggrant följa den information som finns på förpackning/bipacksedel. Kamma håret varje dag med luskam under behandlingstiden samt 2 veckor efter avslutad behandling med lusmedlet. Endast den eller de lusdrabbade behandlas vid löss och helst samtidigt.

Vid flatlöss används disulfiram + bensylbensoat (**Tenutex**).

Vid skabb rekommenderas disulfiram + bensylbensoat (**Tenutex**). Diagnosen bör alltid verifieras genom påvisande av skabbdjur innan behandling ges. Vid skabb behandlas även partner och övrig familj.

